2024-10-01 16:02:02

**CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA (Bluetongue)**

## ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA

**CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA (Bluetongue)** jest chorobą zwierząt przeżuwających, zarówno domowych jak i dzikich wywoływaną przez wirusy. Choruje bydło, owce i kozy, ale także sarny, jelenie, afrykańskie antylopy czy wielbłądy.
Zwierzęta nie zarażają się bezpośrednio od siebie, a jedynie poprzez owady kłująco – ssące z rodzaju Culicoides (rodzina: kuczmany) oraz poprzez krew lub nasienie.
Choroba nie przenosi się na inne gatunki zwierząt gospodarskich i domowych oraz na ludzi.
**♦ Oznacza to, że mięso, mleko, skóry i wełna oraz inne produkty pochodzące od przeżuwaczy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi ♦**

**Choroba podlega obowiązkowi zwalczania na terenie RP !!!**

**Objawy u bydła:**
U bydła częstość zachorowań jest wyższa niż u owiec, choć zwykle nie obserwuje się tak wyraźnych objawów klinicznych choroby. Na zakażenie wirusem wrażliwe są płody, szczególnie w fazie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Stąd w wyniku zakażenia dochodzi do wodogłowia płodu i deformacji wrodzonych.
**Bydło po przechorowaniu może stać się nosicielem, co prowadzi do zakażania kuczmanów i przenoszenia choroby za ich pośrednictwem na zwierzęta zdrowe.**
Objawy kliniczne u krów dorosłych mogą nie być widoczne nawet do 60-80 dnia po zakażeniu. Jednakże jeśli wystąpią, można zaobserwować:
- gorączkę,
- zapalenie mięśni,
- ślinienie,
- zaczerwienienie, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej jamy ustnej oraz innych eksponowanych nabłonków, głównie strzyków,
- owrzodzenie opuszki zębowej i niekiedy końca języka;
- zapalenie koronki i tworzywa racic;
- u krów mlecznych – łuszczenie się naskórka strzyków wraz z tworzeniem się strupów,
- niepłodność i ronienia, rodzenie zdeformowanych i słabych cieląt.

**Objawy u owiec:**
- posmutnienie, depresja,
- gorączka powyżej 41 C,
- stan zapalny jamy ustnej, któremu towarzyszy obfite ślinienie,
- obrzęk głowy, w szczególności warg i języka,
- przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej,
- sinica warg i języka,
- owrzodzenie warg, opuszki zębowej oraz w niektórych przypadkach języka;
- obrzęki, skręcanie głowy i wymioty,
- zapalenie koronki i tworzywa racic powodujące kulawiznę, sztywny chód i zzucie puszki racicowej,
- u zakażonych samic ciężarnych może dochodzić do poronień lub rodzenia zdeformowanych jagniąt.

**Główny Lekarz Weterynarii zaleca hodowcom przeżuwaczy:**

- **wystrzegać się zakupu zwierząt do własnej hodowli pochodzących z niewiadomego źródła,**
- **zapewnić okresowe wizyty lekarza weterynarii w gospodarstwie**
- **jak najszybciej zgłaszać lekarzowi weterynarii wszelkie podejrzane objawy kliniczne oraz „nienormalne" zachowanie się zwierząt,**
- **zwalczać owady w pomieszczeniach inwentarskich, w których przebywają zwierzęta.**

Więcej informacji na stronie https://www.wetgiw.gov.pl

**Informacje o artykule**

| | |
|---|---|
| **Autor:** | |
| **Zredagował(a):** | Mirosław Czynsz |
| **Data powstania:** | 01.10.2024 16:02 |
| **Data ostatniej modyfikacji:** | |
| **Liczba wyświetleń:** | 912 |
| **Wydrukowano z serwisu:** | piotrkowkujawski.pl |
| **Wydrukowano dnia:** | 2026-11-17 01:20:04 |